

Royal Agriseeds

Tinda cultivation method and guidance

Climatic Conditions for Cultivation:

Tinda grows well in warm and dry weather with abundant sunlight. Most suitable crops originate when day temperature is around 25°C. For normal growth, they require a favorable average monthly temperature of 25°C to 30°C. All female flowers start developing as the number of female flowers decreases.

Sowing Period:

Kharif: May-June

Seed Rate:

2–2.5 Kg/ha

Spacing (cm):

Row to Row: 60–75 cm

Plant to Plant: 15–20 cm

Adequate amount of manure:

Use **15–20 tonnes of well decomposed FYM** at the time of field preparation. Use fertilizers in four parts as per the following method (Kg/ha):

Stage	N	P	K
At the time of field preparation	50	100	100
20 days after transplantation	50	00	00
Before flowering	50	00	00
After first weeding	50	00	00
Total	200	100	100

Disclaimer:

The information given in this leaflet is based on field trials and company research under normal conditions. However, soil and crop management practices may affect results. Growers are advised to follow local agricultural recommendations and consult experts where necessary.

Royal Agriseeds

Address: Jagdev Singh Chowk, Sirsa – 125055

रॉयल एग्रीसीड्स

टिंडा की खेती की विधि एवं मार्गदर्शन

खेती के लिए उपयुक्त जलवायु:

टिंडा की फसल गर्म एवं शुष्क जलवायु में अच्छी होती है। इसकी अच्छी वृद्धि के लिए पर्याप्त धूप आवश्यक है। सामान्य वृद्धि के लिए 25°C से 30°C का औसत तापमान उपयुक्त माना जाता है। अनुकूल मौसम में पौधों पर अधिक संख्या में मादा फूल आते हैं, जिससे उत्पादन बढ़ता है।

बुवाई का समय:

खरीफ: मई-जून

बीज दर:

2–2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर

दूरी (सेमी में):

कतार से कतार: 60–75 सेमी

पौधे से पौधा: 15–20 सेमी

खाद एवं उर्वरक प्रबंधन:

खेत की तैयारी के समय **15–20 टन अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद (FYM)** प्रति हेक्टेयर डालें। उर्वरकों का प्रयोग निम्नानुसार करें:

अवस्था	नाइट्रोजन (N)	फास्फोरस (P)	पोटाश (K)
खेत की तैयारी के समय	50	100	100
रोपाई/अंकुरण के 20 दिन बाद	50	00	00
फूल आने से पहले	50	00	00
पहली निराई-गुड़ाई के बाद	50	00	00
कुल	200	100	100

अस्वीकरण:

इस पत्रक में दी गई जानकारी सामान्य परिस्थितियों में किए गए परीक्षणों एवं अनुभवों पर आधारित है। मिट्टी, जलवायु एवं कृषि प्रबंधन के अनुसार परिणामों में भिन्नता हो सकती है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे स्थानीय कृषि विशेषज्ञों के सुझावों का पालन करें।

रॉयल एग्रीसीड्स

पता: जगदेव सिंह चौक, सिरसा – 125055

రాయల్ అగ్రిసీడ్స్

టిండా సాగు విధానం మరియు మార్గదర్శాలు

సాగుకు అనుకూల వాతావరణం:

టిండా పంట వేడి మరియు పొడి వాతావరణంలో బాగా పెరుగుతుంది...

విత్త సమయం: మే - జూన్

విత్తన మోతాదు:

హెక్టారుకు 2-2.5 కిలోలు

మొక్క మధ్యదూరం:

వరుసల మధ్యదూరం : 60-75 సెం.మీ

మొక్క మధ్యదూరం : 15-20 సెం.మీ

ఎరువుల నిరర్హణ:

దశ (Stage)	నత్రజని (N)	భాస్వరం (P)	పొటాష్ (K)
భూమి సిద్ధం చేసే సమయంలో	50	100	100
మొలకెత్తిన 20 రోజుల తరువాత	50	00	00
పుష్పించే ముందు	50	00	00
మొదటి కలుపు తీసిన తరువాత	50	00	00
మొత్తం	200	100	100

నిరాకరణ:

ఈ కరపత్రంలో ఇవ్వబడిన సమాచారం...

చిరునామా: జగదేవ్ సింగ్ చౌక్, సిరాసా 125055

ਰਾਇਲ ਐਗਰੀਸੀਡਜ਼

ਟਿੰਡਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ

ਖੇਤੀ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਜਲਵਾਯੂ:

ਟਿੰਡੇ ਦੀ ਫਸਲ ਗਰਮ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਵਾਧ ਲਈ ਪ੍ਰਚੁਰ ਧੁੱਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਸਲ ਦੀ ਆਮ ਵਾਧ ਲਈ 25°C ਤੋਂ 30°C ਤੱਕ ਦਾ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਉਚਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਕੂਲ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਮਾਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ:

ਖਰੀਫ਼: ਮਈ – ਜੂਨ

ਬੀਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ : 2–2.5 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ

ਦੂਰੀ:

- ਕਤਾਰ ਤੋਂ ਕਤਾਰ: 60–75 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ
- ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਪੌਦਾ : 15–20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ

ਖਾਦ ਅਤੇ ਖਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ:

ਖੇਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਮੇਂ 15–20 ਟਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜੀ ਹੋਈ ਗੋਬਰ ਦੀ ਖਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਪਾਓ। ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋ:

ਪੜਾਅ	ਨਾਈਟਰੋਜਨ (N)	ਫਾਸਫੋਰਸ (P)	ਪੋਟਾਸ਼ (K)
ਖੇਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਮੇਂ	50	100	
ਅੰਕੁਰਣ ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ	50	00	00
ਫੁੱਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ	50	00	00
ਪਹਿਲੀ ਨਿਰਾਈ-ਗੁਡਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ	50	00	00
ਕੁੱਲ (Total)	200	100	100

ਅਸਵੀਕਰਨ (Disclaimer)

ਇਸ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਅਤੇ ਤਜਰਬਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ, ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ।

ਪਤਾ : ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੌਕ, ਸਿਰਸਾ – 125055

ராயல் அக்ரிசீட்ஸ்

டிண்டா சாகுபடி முறை மற்றும் வழிகாட்டி

சாகுபடிக்கு ஏற்ற காலநிலை:

டிண்டா பயிர் வெப்பமான மற்றும் வறண்ட காலநிலையில் நன்கு வளரும். இதன் சிறந்த வளர்ச்சிக்கு போதுமான சூரிய ஒளி அவசியம். பயிரின் இயல்பான வளர்ச்சிக்கு 25°C முதல் 30°C வரை சராசரி வெப்பநிலை மிகவும் ஏற்றதாகும். சாதகமான காலநிலையில் அதிக அளவில் பெண் பூக்கள் உருவாகி, மகசூல் அதிகரிக்கும்.

விதைப்பு காலம்

கரீஃப் : மே – ஜூன்

விதை அளவு: ஹெக்டேருக்கு 2-2.5 கிலோ

இடைவெளி

- வரிசைக்கு வரிசை: 60-75 செ.மீ
- செடிக்கு செடி: 15-20 செ.மீ

உர மேலாண்மை

நிலத்தைத் தயாரிக்கும் போது ஹெக்டேருக்கு 15-20 டன் நன்கு மக்கிய தொழு உரம் (FYM) இட வேண்டும். இரசாயன உரங்களை பின்வரும் முறையில் பயன்படுத்தவும்:

நிலை (Stage)	நைட்ரஜன் (N)	பாஸ்பரஸ் (P)	பொட்டாசியம் (K)
நிலம் தயாரிக்கும் போது	50	100	100
முளைத்த 20 நாட்கள் கழித்து	50	00	00
பூக்கும் முன்	50	00	00
முதல் களை எடுப்பிற்குப் பின்	50	00	00
மொத்தம் (Total)	200	100	100

மறுப்பு அறிவிப்பு

இந்த துண்டுப் பிரசுரத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் சாதாரண சூழ்நிலைகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வுகள் மற்றும் களப் பரிசோதனைகளின் அடிப்படையில் வழங்கப்பட்டவை. மண் தன்மை, காலநிலை மற்றும் பயிர் மேலாண்மை முறைகளின் அடிப்படையில் விளைவுகள் மாறுபடலாம். விவசாயிகள் உள்ளூர் வேளாண் நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளைப் பின்பற்றுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

முகவரி: ஜகதேவ் சிங் செளக், சிர்சா - 125055

রয়্যাল অ্যাগ্রিসিডস

টিন্ডা চাষ পদ্ধতি ও নির্দেশিকা

চাষের উপযোগী জলবায়ু:

টিন্ডা ফসল উষ্ণ ও শুষ্ক আবহাওয়ায় ভালো জন্মায়। পর্যাপ্ত সূর্যালোক এর সঠিক বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফসলের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য ২৫°C থেকে ৩০°C গড় তাপমাত্রা উপযুক্ত। অনুকূল আবহাওয়ায় অধিক সংখ্যক স্ত্রী ফুল গঠিত হয়, ফলে ফলন বৃদ্ধি পায়।

বপনের সময়:

খরিফ (Kharif): মে – জুন

বীজের হার: প্রতি হেক্টরে ২-২.৫ কেজি

দূরত্ব:

- সারি থেকে সারি: ৬০-৭৫ সেমি
- গাছ থেকে গাছ: ১৫-২০ সেমি

সার ব্যবস্থাপনা

জমি প্রস্তুতির সময় প্রতি হেক্টরে ১৫-২০ টন ভালোভাবে পচানো গোবর সার (FYM) প্রয়োগ করুন। রাসায়নিক সার নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে ব্যবহার করুন:

পর্যায়	নাইট্রোজেন (N)	ফসফরাস (P)	পটাশ (K)
জমি প্রস্তুতির সময়	50	100	100
অঙ্কুরোদগমের ২০ দিন পরে	50	00	00
ফুল আসার আগে	50	00	00
প্রথম নিড়ানি দেওয়ার পরে	50	00	00
মোট	200	100	100

ঘোষণা

এই লিফলেটে প্রদত্ত তথ্য সাধারণ পরিস্থিতিতে পরিচালিত গবেষণা ও মাঠ পর্যায়ের পরীক্ষার ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়েছে। মাটির ধরন, আবহাওয়া এবং ফসল ব্যবস্থাপনার উপর ভিত্তি করে ফলাফল ভিন্ন হতে পারে। কৃষকদের স্থানীয় কৃষি বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী চাষাবাদ করার অনুরোধ করা হচ্ছে।

ঠিকানা: জগদেব সিং চৌক, সিরসা - ১২৫০৫৫